



l'URM vous informe


MÉDECINS, MOBILISEZ-VOUS POUR LE DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL

Si **chaque médecin** remettait au moins **100 tests** de dépistage **par an**, le taux de participation serait supérieur à 50% (objectif national). Actuellement en 2014/2015 il est de 35 %.

Activité annuelle de remise de tests par les MG

**350 MG ont remis
au moins un test**

**50 tests remis en
moyenne par MG/an**



**3^{ème} cancer
le plus
meurtrier**

**90%
de guérison
s'il est
détecté tôt**

Cancer Colorectal

Le point sur la pratique de dépistage

Quelle modalité de dépistage, pour qui ?

➤ Le patient a entre 50 et 74 ans sans facteurs de risques particuliers

Le patient n'a aucune histoire personnelle ou familiale susceptible de prédisposer au CCR, ni symptôme pouvant évoquer un CCR. Le niveau de risque est « moyen ». Le seul facteur de risque est l'âge.

Proposer un test immunologique de recherche de sang dans les selles.

➤ Le patient a des antécédents personnels ou familiaux de maladie colorectale (Cancer, RCH, Crohn)

Dans ce cas, le patient est à risque dit « élevé » de développer un cancer colorectal au cours de sa vie. Adresser le patient à un gastroentérologue pour un suivi adapté.

Proposer une coloscopie.

➤ Le patient a des cas de maladie héréditaire touchant le colon ou le rectum dans sa famille

Dans ce cas, le patient est à risque dit « très élevé » de développer un cancer colorectal au cours de sa vie. Adresser le patient à un gastroentérologue ou une consultation d'oncogénétique (CHUM Clarac) pour un suivi adapté.

Proposer une coloscopie.

➤ Le patient a moins de 50 ans ou plus de 74 ans

Avant 50 ans, sans symptôme, ni antécédent personnel ou familial de polype, de cancer ou de maladie touchant le côlon ou le rectum, le patient n'est pas concerné par le dépistage car ce type de cancer est rare avant cet âge. Après 74 ans, le patient ne reçoit plus d'incitation au dépistage. Mais la poursuite de tests peut faire l'objet d'une discussion au cas par cas.

➤ Le patient a déjà eu une coloscopie

Si la dernière coloscopie date de moins de cinq ans, ou si le patient bénéficie d'une surveillance spécifique, il n'est pas concerné par le programme de dépistage organisé.

Ne pas proposer un test de recherche de sang dans les selles.

