

VACCINATION

Déroulement de la consultation :



Vous remplissez le questionnaire vaccination contre la Covid, I

Vérifier l'aptitude du patient à la vaccination.

La vaccination peut-être alors être réalisée.

Vous saisissez les éléments dans « Vaccin Covid » ; accessible soit via votre espace amelipro par carte CPS, soit directement sur le site vaccination-covid.ameli.fr par carte e-CPS.

Si vous n'avez pas votre carte, merci de remplir le fichier et de le conserver pour renseigner ensuite le SIVAC sur le site de la CPAM.

Imprimez le document à remettre au patient après l'injection et n'oubliez pas de le signer !

Après l'injection, une surveillance de 15 min doit être observée pour chaque personne vaccinée.



Rappeler au patient, qu'une 2ème injection doit être réalisée 5 à 6 semaines plus tard.

En fin de vaccination, le bilan doit être imprimé, signé et remis au patient, avec le certificat de vaccination Il lui servira de certificat de vaccination.

Tous les patients âgés de plus de 12 ans sont éligibles à la vaccination PFIZER

Depuis votre ordinateur équipé d'un lecteur de carte



1. Téléchargez l'application e-CPS sur votre smartphone ou tablette



2. Insérez votre carte dans votre lecteur et rendez-vous sur <https://wallet.esw.esante.gouv.fr>
3. Laissez-vous guider et activez votre e-CPS
4. Authentifiez-vous auprès de vos services¹ avec votre e-CPS

¹ liste des services sur esante.gouv.fr

Depuis votre téléphone ou votre tablette²



1. Téléchargez l'application e-CPS sur votre smartphone ou tablette



2. Dans l'application, appuyez sur Demander l'activation de la e-CPS et laissez-vous guider
3. Authentifiez-vous auprès de vos services¹ avec votre e-CPS

¹ liste des services sur esante.gouv.fr

² nécessite que vos coordonnées de correspondance (courriel et téléphone) soient enregistrées dans les référentiels de l'ANS

Surveillance : Prévoir une surveillance rapprochée de la personne vaccinée d'au moins 15 minutes

Généralités sur l'anaphylaxie

- Complication exceptionnelle de la vaccination, qui survient dans moins de 1 cas sur 100.000 doses.
 - Survient dans la majorité des cas dans les minutes suivant l'introduction de l'allergène.
- Plus la réaction survient rapidement, plus elle est à risque.

Signes cliniques et conduite à tenir

Prise en charge initiale de l'anaphylaxie par le vaccinateur
(adapté des Recommandations 2016 de la Société Française de Médecine d'Urgence)

