Ce qu'il faut savoir


Les IST représentent un problème de santé publique majeur, en raison des complications à long terme

- Douleurs pelviennes
- Infections génitales hautes
- Infertilités
- Cancer

Il existe plus d'une trentaine d'IST infectieux viraux, parasitaires

Les médecins libéraux ont un rôle essentiel à jouer dans la lutte, le dépistage, la prévention et la prise en charge de ces infections, d'autant plus que leur transmission reste très active en

- > Chlamydiae: 7 10% des cas ces dernières années.
- > Syphilis : taux de positivité passant de **5,76**% en 2019 à **7 16,32**% en 2020.



Conduite à tenir

- > Investiguer et privilégier les examens directs examen d'urine, prélèvement des hommes et des femmes, PCR Herpès...
- > Sérologies VIH et autres permettent de déterminer le statut To du patient.
- > Contrôles en fonction des résultats.
- > Traiter tous les partenaires.



CeGIDD Hôpital Louis Domergue

0596 66 46 00

Contacts utiles

CeGIDDCentre de Santé polyvalent de Martinique

Site de Saint Pierre 0596 65 11 78

cegidd@centredesante-martinique.com

CHUM

Service de Maladies Infectieuses et Tropicales (SMIT) 0596 55 23 01 / 0596 55 23 08

CeGGID

0596 55 97 13

cegidd@chu-martinique.fr

COREVIH

0596 55 96 73

corevih-martinique@chu-martinique.fr

CeGIDDCentre de Santé polyvalent de Martinique Site de Fort de France :

0596 65 11 78 / 0596 60 36 87

egidd@centredesante-martinique.com



Zac de Rivière Roche Rue George Zaïre 97 200 Fort de France

Q 05 96 63 20 33 **a** 05 96 71 93 03

contact@urml-m.org urml-m.org





Infections

Chlamydiæ

Syphilis

Herpès

HPV

Sexuellement

Transmissibles









Pertes vaginales Ecoulement du pénis

- Inflammation des organes génitaux
- Lésions des muqueuses génitales et/ou de la peau, autour des organes génitaux
- Tuméfaction de l'aine
- Douleurs abdominales basses et/ ou des douleurs rectales
- **>** Fièvre, fatigue
- **DESTRUCTION :** Eruptions cutanées à distance





Les IST en Martinique

Virales

Hépatite B

SYMPTOMES ET INCUBATION:

Souvent asymptomatique, Asthénie, hyperthermie, myalgies arthralgies, ictère. Incubation de 1 à 6 mois.

TRANSMISSION:

Sexuelle et sanquine Materno-fœtale

COMPLICATIONS POSSIBLES:

Fibrose, cirrhose et/ou néoplasie.

TRAITEMENT:

Pas de traitement curatif. Dans les cas d'hépatite chronique un traitement anti-viral au long cours peut être nécessaire.

PREVENTION:

Primaire: Education, Vaccination ++, préservatif. Secondaire: Dépistage.

Herpès génital

SYMPTOMES ET INCUBATION:

Parfois asymptomatique. Douleurs, brûlures, vésicules, ulcérations et prurit. Incubation de 2 à 21 jours ensuite réactivation périodique.

TRANSMISSION:

Sexuelle et Materno-fœtale à l'accouchement.

Hépatite C

SYMPTOMES ET INCUBATION:

Souvent asymptomatique. Asthénie, anorexie, nausées, vomissements douleurs abdominales, hyperthermie.

Incubation de 15 à 150 iours.

TRANSMISSION:

Sexuelle et sanquine Materno-fœtale.

COMPLICATIONS POSSIBLES:

Hépatite chronique 80%. 10 - 20% des porteurs

chroniques font une cirrhose et 1 à 5 % d'entre eux un hépatocarcinome.

TRAITEMENT:

Curatif dans 95% des cas par anti-viral.

PREVENTION:

Primaire : éducation Secondaire: dépistage

COMPLICATIONS POSSIBLES:

Herpes néonatal.

TRAITEMENT:

Pas de traitement curatif. Traitement symptomatique anti-viral de **3 à 5 jours** en cas de lésions douloureuses et gênantes. Traitement préventif quotidien si plus de 6 poussées par an.

PREVENTION:

Pendant les poussées abstinence sexuelle.

Papilloma virus

SYMPTOMES ET INCUBATION:

90%: élimination spontanée. Incubation de plusieurs semaines à plusieurs mois.

TRANSMISSION:

Cutanée, muqueuse et sexuelle. Materno-fœtale lors de l'accouchement par voie basse.

TRAITEMENT:

® ALDARA, ® CONDYLINE, Azote liquide, cryothérapie, électrocoagulation ou laser.

PREVENTION: ® GARDASIL 9

Dès l'âge de 11 ans, filles et garçons Secondaire: Frottis cervico-vaginal.

DÉPISTAGE :

Frottis cervico-vaginal et/ou typage viral. Suivi proctologique chez les patients homosexuels masculins.

COMPLICATIONS POSSIBLES

Cancer du col. de l'anus et de la gorge.

Bactériennes & Parasitaires

Neisseria gonorrhéa

SYMPTOMES ET INCUBATION:

Asymptomatique, leucorrhées, anorectite purulente, atteinte pharyngée, arthrite, septicémie, endocardite.

Urétrite avec écoulement purulent, brûlures mictionnelles appelées «chaude pisse»

TRANSMISSION:

Sexuelle et Materno-fœtale lors de l'accouchement par voie basse.

COMPLICATIONS POSSIBLES:

- Hypofertilité chez les hommes
- Stérilité féminine
- Cécité néonatale
- Baisse de la fertilité chez les hommes
- Salpingite compliquée, stérilité ou grossesses extra-utérines chez les femmes.

TRAITEMENT:

® Ceftriaxone 500mg IM.

Une injection à chaque partenaire.

PREVENTION:

Préservatif.

Mycoplasma genitalum

SYMPTOMES ET INCUBATION:

Souvent asymptomatique.



Douleurs pelviennes et écoulements vaginaux ou urétraux parfois des saignements post coïtaux.



Brulure mictionnelle dysurie voire épididymite.

TRANSMISSION:

Sexuelle.

COMPLICATIONS POSSIBLES:

- Prostatite
- Endométrite

TRAITEMENT:

®Azithromycine (2 cp J1 et 1 cp de J2 à J5) Ou **®DOXY CYCLINE** 100 ma

(2 fois par jour pendant 5 jours) On ne traite que les patients symptomatiques.

PREVENTION:

Préservatif.

Syphilis: la grande simulatrice.

La syphilis est causée par le spirochète Treponema pallidum. 3 stades symptomatiques séquentiels ponctués par des périodes latentes asymptomatiques.

Attention! Disparue un temps, elle est actuellement en recrudescence en Martinique. Asymptomatique, elle peut toucher tous les organes, simulant de nombreuses pathologies et avoir de graves conséquences si elle n'est ni dépistée, ni

Dépistage & diagnostic



Dépistage systématique 1 fois par an

Chez la femme enceinte : 1^{er} trimestre et 3^{ème} trimestre

Transmission

Traitement

Par contact cutanéo-muqueux.

®Benzathine pénicilline IM

Le diagnostic : **tests sérologiques** ≠selon le stade de la maladie

Symptômes

Primaire: ulcération indolore accompagnée de ganglion satellite.

Secondaire: Dermatose non prurigineuse des paumes et plantes. Parfois asymptomatique.

Incubation: 10 i à 3 mois.

Tertiaire: lésions neurologiques, osseuses, cardiologiques



Evolution

Non traitée, le patient peut développer une syphilis secondaire ou tertiaire.

tous les ans :

Examen d'urine.

A adapter selon interrogatoire et les pratiques sexuelles.

Recommandations HAS

Chlamydiae

Dépistage & diagnostic

Examen d'urine.

Auto-prélèvement vaginal.

Dépistage systématique

Le dépistage et le traitement des femm

> constituent **le moyen** l'infection néonatale à Chlamydia,

la pneumonie.

Dépister et traiter l'infection nême en l'absence de symptômes

- Atteinte hépatique
- Arthrite infectieuse

Transmission

Sexuelle v compris oro-génitale, ano-génitale Materno-foetale avec risque d'atteinte oculaire pour l'enfant.

Symptomes

Asymptomatique dans 60 % des cas.



Fréquente en Martinique, l'infection à Chlamydia est asymptomatique dans 60%

des cas. Elle est la 1ère cause d'infertilité. Silencieuse, grave par ses complications,

elle peut être quérie par un simple traitement antibiotique.

- Leucorrhée
- Douleurs pelviennes Métrorragies post coïtales
- Douleur testiculaire
- Douleur épididymaire
- Ecoulement au niveau de l'urètre

Incubation: de 2 à 6 semaines

Traitement

®Azithromycine 2 cp J1 et 1 cp de J2 à J5

ll est nécessaire de traiter **en même** le plus efficace de prévenir temps tous les partenaires sexuels.

Evolution

Bien traitée la chlamydiose quérit mais attention recontaminations fréquentes.

Non traitée

- Risque stérilité tubaire / GEU
- Atteinte néonatale