Fiche pratique : Pathologies thyroïdiennes en médecine générale

Nodules thyroïdiens et goitre

- **Diagnostic** : TSH, bilan phosphocalcique
- Recherche signes compressifs : dyspnée positionnelle, dysphagie, modification voix → TDM cervico-thoracique et avis spécialisé (endocrinologue + chirurgien). URGENT
- **Échographie** :
- Classification EU-TIRADS indispensable pour conduite à tenir.
- Cytoponction échoguidée selon critères EU-TIRADS.
- **Nodules à ponctionner** :
 - Nodule Eu-TIRADS 3 > 20 mm
 - Nodule Eu-TIRADS 4 > 15 mm
 - Nodule Eu-TIRADS 5 > 10 mm
- Consultation endocrinologique en général sans urgence avec résultat bilan biologique, échographie et cytoponction.
- **Critères de consultation urgente** :
 - Signe de compression
 - Augmentation rapide (< 6 mois) du diamètre maximal de plus de 20 %, ou cliniquement perceptible,
 - Cytoponction répondant BETHESDA ≥ IV
 - BETHESDA IV : Néoplasme folliculaire ou suspicion de néoplasme folliculaire
 - BETHESDA V : Suspicion de malignité
 - BETHESDA VI : Malin

Références : Recommandations HAS Décembre 2022 & Société Française d'Endocrinologie (SFE)